

インフルエンザ経鼻生ワクチン（フルミスト）について

（特徴）

- ☐ 両側の鼻へ 0.1ml ずつ噴霧します。1 回で完了です。
- ☐ 2～18 歳の方が対象です。
- ☐ 注射が苦手な方、注射で腕がひどく腫れる方、1 回で済ませたい方などに向いています。

（注意事項）

- ☐ 家庭内に 2 歳未満の児、妊婦、授乳婦、免疫不全の方（免疫抑制剤治療中を含む）がおられる場合は、感染させてしまう可能性があるため、不活化ワクチン注射をお勧めします。（生ワクチンを接種された場合は、接種後 1～2 週間は、対象の方との接触を可能な限り控える必要があります）
- ☐ ゼラチンアレルギー、卵アレルギー、鶏肉アレルギー、喘息、重度の鼻づまりや鼻炎がある方、妊娠中、または妊娠の可能性の高い方、免疫抑制の治療中（アトピー治療のオルミエント、サイバインコ、リンヴォックなども含む）の方、無脾症の方は接種できません。
- ☐ 喘息または喘息の既往歴のある 2～4 歳児への接種は推奨されません。

（2026 年 当院での接種に関して）

- ☐ 予約は、WEB 予約のみです。
- ☐ 接種時間は、土曜日午後の「インフルエンザワクチン外来の 14：30（時間厳守）」の
みとさせていただきます。（10 月 3 日から接種開始）
- ☐ 詳細、問診表（フルミスト専用）などは、ホームページのお知らせ欄をご参照ください。
よくお読みになってからご予約ください。不明な点はお気軽にお問い合わせください。
- ☐ 当日、問診の結果、通常の注射に切り替える場合もあります。

不活化ワクチン（注射）		生ワクチン（フルミスト点鼻）
皮下注射	投与方法	鼻腔内に噴霧
13 歳未満は原則 2 回	投与回数	1 回
生後 6 か月～（1 歳からを推奨）	年齢	2～18 歳
あり	痛み	なし
接種部の腫れや痛みなど	副反応	鼻水、鼻閉、咳嗽、咽頭痛など
・ 3,000 円×2 回（12 歳まで） ・ 3,500 円×1 回（13 歳以上）	料金 （税込）	8,500 円
ほぼ同等	予防効果	ほぼ同等

鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチン フルミスト[®]点鼻液を接種される方・ 保護者の方へ


〔監修〕川崎医科大学 小児科学 特任教授 中野 貴司 先生

○ フルミスト点鼻液はこんなワクチンです


- 日本初となる、鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。
- 鼻へ噴霧するため、針を刺す必要がありません。
- 2～18歳の方が対象です。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種は、1回分で完了です。
(左右それぞれの鼻へワクチンを噴霧すれば、終わりです)
- フルミスト点鼻液を接種された方は、積極的に吸入（鼻ですする）する必要はありません。
- ワクチン接種後に、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの副反応が現れることがあります。まれに、ショックやアナフィラキシーなどの重大な副反応が現れることもあります。いつもと違う体調変化や異常を認めた場合は、速やかに医師にご連絡ください。



○ いつ頃からワクチンを接種すればいいの？



- インフルエンザは、例年12月～3月頃に流行し、1月～2月にピークを迎えることが多いので、12月中旬までにインフルエンザワクチンの接種を終えておくことが望めます。




第一三共株式会社



○ フルミスト点鼻液 接種後の注意

- フルミスト点鼻液の接種後30分間は、
ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難など）
の急な副反応が起こることがあります。
医師とすぐに連絡を取れるように
しておきましょう。
- 接種当日は、入浴しても差し支えありません。
- 接種当日は、いつも通りの生活をして構いませんが、
激しい運動は避けましょう。
- 接種後に熱が出ることがあります。
気になる場合は、医師にご相談ください。
（フルミスト点鼻液を接種した）
（ことを医師に伝えてください）
- フルミスト点鼻液の接種後1～2週間は、
重度の免疫不全者との密接な接触は
避けてください。
- 医師が認めた場合は、フルミスト点鼻液と
他のワクチンも同時に
接種することができます。
他のワクチン接種を希望される際は、
医師にご相談ください。



医療機関名



第一三共株式会社